



គោរសារ និយោវិកម្មីខេត្តពុំពេញ

ចុះ ៣ ដែនបាន ២៥៤៩ (អត្រា ៩៥-១០៦)

ยกความเสี่ยงทุกเชิง สำหรับการศึกษาด้วยเมืองทางไกลชั้นนำ



ยกลุ่มอาร์ทีมิชินน: จากยาฆ่าเชื้อมาลาเรียสู่สารต้านมะเร็ง

ตัวใหม่ (Artemisinins: From antimalarial drugs to anti-cancer agents)

ภาณุ.อ.ดร.จรีญ์ เจริญธีรบูรณ์

ภาควิชาชีวเคมีศาสตร์ คณะเคมีศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

รหัส 1-000-SPU-000-0608-01

จำนวน 2.5 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง

วันที่รับรอง: 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

วันที่หมดอายุ: 1 สิงหาคม พ.ศ. 2551

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

หลังจากศึกษาบทความนี้แล้ว ผู้อ่านควรจะสามารถ

1. ทราบถึงคุณสมบัติของยาในกลุ่มอาร์ทีเมชินนทั้งในแง่โครงสร้างพื้นฐาน การละลาย และฤทธิ์สำคัญมาลาเรีย
 2. ทราบฤทธิ์ในการต้านมะเร็งของยาในกลุ่มอาร์ทีเมชินและคุณสมบัติต่างๆ คือ เมแทบอลิซึม เกสัชจลนาสาร์ ปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์และการเกิดอันตรกิริยาของยากลุ่มนี้

ນາຄົດຍ່ອງ

ยาอาร์ทีมิซินินหรือชิงເຫຼຸດເປົ້າມາເປັນສາງທີ່ສັກດໍໄດ້ຈາກພື້ນໃນປະເທດຈິນ *Artemisia annua* ຍານີ້ສາມາດອຳນວຍມາລາເຮົາທຸກໆໜີ້ດຽວມີຫົວໜ້າທີ່ຈຶ່ງດີ່ຕ່ອງຢ່າງນີ້ດື່ອຕ່ອງຢ່າງນີ້ດື່ອນີ້ ພາຍຫັງພົບວ່າອາວົາທີ່ມີມີຊື່ນີ້ແລະອຸນຸພັນນີ້ສາມາດຄົບຍັ້ງການແປ່ງຕົວຂອງເຊັລົ່ມະເຮົງຫລາຍໜີ້ດີ່ເຊັ່ນ ມະເຮົງເມີດເລືອດຂາວ ມະເຮົງລຳໄສ່ໄຫຼູ່ ມະເຮົງຜິວຫັ້ງ ແລະມະເຮົງໃນຂ່ອງປາກ ເປັນດັ່ນ ໂດຍການໃຫ້ເຫຼືກຫວີຍ *transferrin* ກ່ອນການໃຫ້ຢ່າຊ່າຍເພີ່ມປະສິກົນກາພຂອງຍາກລຸ່ມອາວົາທີ່ມີມີຊື່ນີ້ນັ້ນ ການໃຫ້ຢ່າອາວົາທີ່ມີມີຊື່ນີ້ຮ່ວມກັນຢາຕ້ານມະເຮົງມາຕຽບຮູ້ານຊ່າຍເພີ່ມການຕອບສົນອອງຕ່ອຍມາແລະຍື່ດ້າຍຊຸ່ຜູ້ປ່ວຍໄດ້ນານີ້ນີ້ໃນການຮັກໝາຜູ້ປ່ວຍມະເຮົງຜິວຫັ້ງຮະຢະສຸດທ້າຍສອງຮາຍທີ່ໄມ່ຕອບສົນອອງຕ່ອຍມາຕຽບຮູ້ານເພີ່ມຍອງຍ່າງເດືອຍ ເນື່ອຈາກເປັນຍາທີ່ມີການໃຫ້ມານານີ້ໃນຜູ້ປ່ວຍມາລາເຮົຍຈຳນວນມາກພົບວ່າມີຄວາມປລອດຈັກສູງແລະໄມ່ກ່ອນໃຫ້ເກີດອາການຂ້າງເຄີຍ ເມື່ອສາມາດອອກຖົ່ມທີ່ໄດ້ດັກນັ້ນເຊັລົ່ມະເຮົງທີ່ດື່ອຕ່ອຍຢາຕ້ານມະເຮົງນີ້ດື່ອນີ້ ຮວມທີ່ມີກຸລິກາໃນການອອກຖົ່ມທີ່ແຕກຕ່າງຈາກຢາຕ້ານມະເຮົງນີ້ດື່ອນີ້ ທຳໄຫ້ຢາໃນກລຸ່ມອາວົາທີ່ມີມີຊື່ນີ້ເປັນອີກການເລືອກໜຶ່ງໃນການໃຫ້ຮ່ວມກັນຢາຕ້ານມະເຮົງມາຕຽບຮູ້ານໃນການບຳນັດມະເຮົງໃນອານາຄົດ

คำสำคัญ

ยกกลุ่มอาร์ทีมิชินนิ บาก้าเชื้อมาลาเรีย สารต้านมะเร็ง

artemisinins, antimalarial drugs, anti-cancer agents

บทนำ

มะเร็ง (cancer) หรือเนื้องอกร้ายเป็นการเจริญเติบโตของเซลล์อย่างรวดเร็วโดยไม่มีขีดจำกัดจนทำให้เกิดเป็นก้อนเนื้องอกขนาดใหญ่ มีผลกระทบต่อการทำงานของเซลล์หรืออวัยวะปกติที่อยู่ใกล้เคียงและทำให้อวัยวะนั้นไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ นอกจากนั้นเซลล์มะเร็งสามารถกระจายหรือแทรกเข้าสู่เนื้อเยื่ออื่นทั่วร่างกายทางกระแสเลือดและน้ำเหลือง¹ และลุกลามไปส่วนอื่นของร่างกายจนทำให้เสียชีวิตในที่สุด เมื่อเกิดขึ้นในอวัยวะใดจะถูกเรียกชื่อตามอวัยวะนั้น เช่น มะเร็งปอด มะเร็งปากดลูก และมะเร็งเต้านม เป็นต้น จากข้อมูลสำนักงานสถิติระหว่างปี 2542-2547 พบว่า โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายของอันดับ 1 ของคนไทย พบร้อยละทุกเพศทุกวัยและมีอัตราการตายรวมสูงขึ้นทุกปี² สำหรับการรักษาทำได้หลายวิธีคือ การผ่าตัด การฉายรังสีและการให้เคมีบำบัด การผ่าตัดและการฉายรังสีเป็นการกำจัดเนื้องอกออกไป ซึ่งเป็นการรักษาเฉพาะที่เหมาะกับมะเร็งที่ยังไม่แพร่กระจาย สำหรับการให้เคมีบำบัดเป็นการรักษาโดยใช้ยาต้านมะเร็ง ซึ่งสามารถทำลายเซลล์มะเร็งตันตอและเซลล์มะเร็งที่แพร่กระจายไปได้ การรักษาอาจใช้ร่วมกันมากกว่าหนึ่งวิธีเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดี

ปัจจุบันยาต้านมะเร็งมีกลไกแตกต่างกัน โดยครอบคลุมจากยาในกลุ่มฮอร์โมนจนถึงยาที่มีผลต่อเป้าหมายในระดับโมเลกุล ซึ่งเพิ่มทางเลือกในการรักษาขึ้น อย่างไรก็ตามมีโรคมะเร็งเพียงไม่กี่ชนิดที่ประสบความสำเร็จการรักษา เช่น มะเร็งเต้านม เนื่องจากข้อจำกัดของความจำเพาะเจาะจงของยาและการต้องยาของเซลล์มะเร็ง ความไม่จำเพาะเจาะจงทำให้ยาต้านมะเร็งมีผลข้างเคียงรุนแรง เช่น การกดการทำงานของไขกระดูกมีผลให้ติดเชื้อได้ง่ายและอ่อนเพลีย ความเป็นพิษต่อไต เป็นอาหาร ผมร่วง ห้องเสีย คลื่นไส้ และอาเจียน เป็นต้น³ ทำให้ผู้ป่วยต้องทนนานต่อการใช้ยา และบางรายเสียชีวิตลงจากผลข้างเคียงของยา การต้องยาต้านมะเร็งพบได้บ่อยมากทั้งแบบการต้องยาตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้รับยา (Inherent resistance) และที่เกิดภายหลังจากได้รับยาไประยะหนึ่งแล้ว (acquired resistance) โดยมีสาเหตุจากหลายปัจจัย เช่น การเพิ่มการขับยาออก การสร้าง glutathione เพิ่มเพื่อลดพิษของยา และการลด apoptotic response เป็นต้น⁴ รวมทั้งความต้องการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาในโรงพยาบาลโดยการลดแทนด้วยยาเตรียมชนิดรับประทานได้ส่งผลให้มีการค้นคว้าหายาต้านมะเร็งตัวใหม่เพื่อให้ได้ยาใหม่ที่มีฤทธิ์เฉพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง ที่ไม่เกิดการต่อยา และมีราคาถูก ยาจากสมุนไพรเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ได้รับความสนใจเนื่องจากมีความปลอดภัยสูง

Artemisinins


ยาาร์ทีมิชินิน (artemisinin) หรือ qing hoa zu เป็นสารสำคัญที่สกัดได้จากพืช *Artemisia annua* ซึ่งเรียกว่า หัวใบใบในภาษาจีนว่า ชิง荷า (Qinghoa) หรือ sweet wormwood เป็นพืชที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทยและใช้ผลให้มาหากันกว่าพันปี artemisinin ถูกค้นพบครั้งแรกในปีค.ศ. 1971 เมื่อประเทศไทยมีการค้นคว้าหายาจากสมุนไพรเพื่อใช้รักษาโรคไข้จับสั่นหรือโรคมาลาเรีย ยาาร์ทีมิชินินมีโครงสร้างทางเคมีเป็น sesquiterpene lactone โดยมีพันธะเออนโดเปอร์ออกไซด์ (-O-O-) เป็นส่วนที่สำคัญในการออกฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรีย การสังเคราะห์ยาาร์ทีมิชินินทำได้ยากมากแต่สามารถสกัดแยกให้บริสุทธิ์ได้ง่ายจากการตกลงของสารสกัดจากพืช ยาาร์ทีมิชินินมีปัญหาในด้านการเตรียมในรูปแบบยาต่าง ๆ เนื่องจากคุณสมบัติที่ละเอียดไม่เดาทั้งในน้ำและน้ำมัน ทำให้มีการสังเคราะห์อนุพันธ์ขึ้นมาโดยใช้ยาาร์ทีมิชินินเป็นสารตั้งต้นโดยการเปลี่ยนแปลงที่หมู่ตรงควรบอนตำแหน่งที่ 10 เพื่อให้ได้สารที่มีคุณสมบัติละเอียดน้ำได้ดี เช่น artesunate และ dihydroartemisinin เป็นต้น และสารที่มีคุณสมบัติละเอียดในไขมันได้ดี เช่น artemether และ arteether เป็นต้น แต่เดิมรูปแบบยาเตรียมของยาาร์ทีมิชินินมีเพียงยารับประทานเท่านั้น แต่ภายหลังการพัฒนาให้สารมีคุณสมบัติการละเอียดที่เปลี่ยนไปในรูปของอนุพันธ์มีผลทำให้สามารถเตรียมยาได้ในรูปแบบยาเตรียมอีน เช่น ยาเหน็บทารหนัก และยาฉีดเข้าเส้นหลอดเลือดดำ เป็นต้น⁵ โครงสร้างของยาในกลุ่มยาาร์ทีมิชินินแสดงดังรูปที่ 1

ยาาร์ทีมิชินินและอนุพันธ์สามารถฆ่าเชื้อมาลาเรียได้ทุกชนิด รวมทั้งเชื้อมาลาเรียสายพันธุ์ดื้อยาต้านมาลาเรียชนิดอื่น ๆ และยากลุ่มนี้มีราคาไม่สูงนัก⁵ จึงมีการใช้อย่างแพร่หลายในที่ที่มีการระบาดของโรคมาลาเรียรวมทั้ง

ประเทศไทย พบร่วมกับจีนและไม่มีรายงานพิชต่อผู้ใช้มากนัก⁶ แม้ว่าปรากฏการรายงานพิษของ artemether และ arteether ต่อระบบประสาทในสัตว์ทดลอง⁷ ใน การรักษา malaria ด้วยยาจากกลุ่มอาร์ทีมิซินพบได้น้อยกว่าคนไข้กลับ มีเชื้อมalaria เรียบร้อยในช่วง 28 วันที่พักฟื้นในโรงพยาบาล (recrudescence) แต่อย่างไรก็ตามยังไม่พบการเกิดเชื้อ malaria เรียบที่ดีต่ออย่างกลุ่มนี้ อาจเนื่องจากการออกฤทธิ์ช้า เชื้อมalaria เรียบและการกำจัดยาออกจากร่างกายแล้วเลือดอย่างรวดเร็ว ทำให้เชื้อมalaria เรียบไม่สัมผัสกับยานานจนสามารถพัฒนาให้ทนต่อยาได้มากขึ้น จากคุณสมบัติทั้งหลายดังกล่าวมา้นำมาให้ยาจากกลุ่มอาร์ทีมิซินเป็นที่สนใจในการศึกษาอย่างกว้างขวางในต่างๆ รวมทั้งการทดสอบฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง

ฤทธิ์ต้านมะเร็งของยาในกลุ่มอาร์ทีมิซิน

ในปีค.ศ. 1992 Sun และคณะ⁸ ได้รายงานฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งเป็นครั้งแรกของอนุพันธ์อาร์ทีมิซิน นำมาสู่ ความสนใจในการศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งของยาจากกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่องมาก many ทั้งในห้องปฏิบัติการและการศึกษาเชิงคลินิก พบร่วมกับกลุ่มนี้สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งหลายชนิดจากมะเร็งต่อไปนี้ ได้แก่ มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งสมอง มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ มะเร็งผิวหนัง และมะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นต้น ในความเข้มข้นระดับ nanoโมลาร์ถึงไมโครโมลาร์⁹



Artemisinin:	$R_1: =O$ $R_2: -CH_3$
Artemether:	$R_1: -O-CH_3$ $R_2: -CH_3$
Arteether:	$R_1: -O-CH_2-CH_3$ $R_2: -CH_3$
Artesunate:	$R_1: -O-CO-CH_2-CH_2-COOH$ $R_2: -CH_3$

รูปที่ 1 โครงสร้างของยา artemisinin และอนุพันธ์

เมื่อนำ artesunate มาทดสอบกับเซลล์มะเร็งจำนวน 60 ชนิด ที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งต่างๆ ทั้งสิ้น 9 โรค ได้แก่ มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งผิวหนัง มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งไต มะเร็งรังไข่ มะเร็งสมอง มะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งเต้านม พบร่วมกับยาต้านมะเร็งถึง 55 ชนิดที่ไวต่อ yanii ด้วยความเข้มข้นระดับ nanoโมลาร์ ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ตามความไวต่อยาจากมากไปน้อย ได้แก่ leukemia และ colon cancer cell ($IC_{50} = 1-2 \mu M$) > melanoma, breast, ovarian, prostate, CNS และ renal cancer cell > non-small cell lung cancer cell ($IC_{50} = 26 \mu M$)¹⁰ ซึ่งเป็นระดับ ความเข้มข้นเดียวกับยาต้านมะเร็งมาตรฐานอื่นๆ เช่น doxorubicin, vincristine, methotrexate และ hydroxyurea¹⁰ โดยพบว่า artesunate ออกฤทธิ์ได้ดีกว่า arteether และ artemether¹¹ นอกจากนี้ artesunate สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งจากต่อมไทรอยด์ (medullary thyroid carcinoma cells)¹², เซลล์มะเร็งชนิด Kaposi's sarcoma¹³ และเซลล์มะเร็งในช่องปาก¹⁴

สำหรับ dihydroartemisinin พบร่วมกับยาต้านมะเร็งตัวของ glioma cells¹⁵ และ chronic myeloid leukemia K562 cells¹⁶ ขณะที่ยาท้า dihydroartemisinin สามารถยับยั้งการเกิดมะเร็งของ papillomavirus-expressing epithelial cells ในช่องปากสูนัขได้¹⁷ ซึ่งอาจนำมาศึกษาเพื่อใช้ในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกที่เกิดจากการติดเชื้อ papillomavirus ได้ นอกจากนี้ยังพบว่าอนุพันธ์อื่นของ artemisinin มีผลต้านเซลล์มะเร็งได้ด้วย เช่น artelinic acid, sodium artelinate, deoxyartemisinin, artemisitene, deoxyartemisitene, artemisinic acid, arteannuin B, cyano derivatives, aryl derivatives, dimer derivatives, trimer derivatives และ tetramer derivative เป็นต้น ดังสรุปไว้ในตารางที่ 1


ตารางที่ 1 ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งในมะเร็งชนิดต่าง ๆ ของยากลุ่มอาร์ทีมิซิน*

Tumor type	Cell line	Compound
Leukemia	P388	artemisinin, deoxyartemisinin, cyano and aryl artemisinin derivatives, cyano and aryl dihydroartemisinin derivatives, deoxoartemisinin derivative, deoxoartemisinin derivative dimers and trimer
	CCRF-CEM	artemisinin, artesunate, deoxyartemisitene
	EL4	Deoxoartemisinin derivatives, deoxoartemisinin derivative dimers and trimer
	L1210	cyano and aryl dihydroartemisinin derivatives
	KG-1a	artesunate
	HL-60	artesunate, deoxyartemisitene
	K-562	dihydroartemisinin ¹⁶ , deoxyartemisitene
	RPMI-8226	deoxyartemisitene
Ehrlich ascites	SR	deoxyartemisitene
	EAT/EN2	artemisinin, artesunate, hydroperoxyartemisitene, ethylperoxyartemisitene, 11-hydroxyartemisinin, 11-hydroxy-1-epi-artemisinin, anhydrodihydroartemisinin, formate ester of artemisinin, ketone of artemisinin, dihydroartemisinin, artemether, arteether, artelanic acid, artelinate, artemisitene, 11-epoxide artemisitene, artemisinic acid, arteannuin B, ether dimers of dihydroartemisinin,
CNS tumor	U373	artemisinin, artesunate, dihydroartemisinin ¹⁵
	U-87.MG	artesunate
Lung cancer	A549	cyano and aryl artemisinin derivatives, cyano and aryl dihydroartemisinin derivatives
	HOP-92	deoxyartemisitene
Colon cancer	HT-29	cyano and aryl dihydroartemisinin derivatives, deoxoartemisinin derivatives, deoxoartemisinin derivative dimers and trimer
Breast cancer	MDA-MB-231	artesunate
	MCF-7	Deoxyartemisitene, deoxoartemisinin derivatives, deoxoartemisinin derivative dimers and trimer
	BT-549	deoxyartemisitene
	BC	C-16 derivatives of artemisinin, artemisinin dimer, artemisinin trimer and tetramer
Ovarian cancer	IGROV1	deoxyartemisitene
Epidermoid cancer	KB	C-16 derivatives of artemisinin, artemisinin dimer, artemisinin trimer and tetramer
Prostate cancer	C1A, C2D, C2G, C2H	deoxoartemisinin derivative dimers
Thyroid carcinoma	medullary thyroid carcinoma cells	artesunate ¹²
Choriocarcinoma	BeWo	deoxoartemisinin derivative, deoxoartemisinin derivative dimers and trimer
Oral cancer	HPV-16 transformed human oral epithelial (IHOK) cell line	artemisinin ¹⁴
Various	NCI cell line	Artesunate ¹⁰ , artemisinin derivative dimer

* (ตารางถูกดัดแปลงมาจากตารางในเอกสารอ้างอิงหมายเลข 9 และเพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์ตามการอ้างอิงข้างต้น)

เหล็กและการออกฤทธ์ต้านมะเร็งของยาในกลุ่มอาร์ทีมิชินิน

โครงสร้างที่สำคัญของยาในกลุ่มอาร์ทีมิชินินในการต้านมะเร็งมีความสอดคล้องกับการผ่าเชื้อมาลาเรียคือ พันธะเอนโดเปอร์ออกไซด์ (endoperoxide bridge, -O-O-) ¹⁸ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าสารกลุ่ม peroxide สามารถให้ reactive oxygen species ได้ ซึ่งเมื่อมี free ferrous ion (Fe^{2+}) อ่ายู่ด้วยจะเกิดปฏิกิริยาเคมีที่เรียกว่า ปฏิกิริยาเฟนตอน (Fenton reaction)



โดยมีการตั้งสมมติฐานว่า Fe^{2+} ไปรऐปฏิกิริยานในการสลายของ -O-O- ในโครงสร้างของอาร์ทีมิชินิน ทำให้เกิดอนุมูลิสระที่อะตอมของออกซิเจน (O-centered radicals) หรือ alkoxy radicals และเปลี่ยนไปเป็น C-centered radical กับ neutral products ซึ่งเชื่อว่า reactive intermediates เป็นตัวที่ทำให้มีฤทธิ์ผ่าเชื้อมาลาเรีย ดังนั้นการออกฤทธิ์ของยาในกลุ่มอาร์ทีมิชินินต่อเซลล์มะเร็งอาจเป็นกลไกเดียวกับการผ่าเชื้อมาลาเรีย โดยเซลล์มะเร็งมักมีการสะสมของเหล็กในเซลล์และต้องการเหล็กในการเจริญเติบโตในปริมาณที่มากกว่าเซลล์ปกติ¹⁹ ทำให้มีการนำเอาเหล็กและโปรตีนที่จับเหล็ก (transferrin) มาศึกษาร่วมกับยาในกลุ่มอาร์ทีมิชินินในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง พบว่า เหล็กช่วยเพิ่มฤทธิ์ต้าน CCRF-CEM leukemia cells และ U373 astrocytoma cells ของ artemisinin/artesunate มากขึ้นถึง 1.5 - 10.3 เท่า เทียบกับสภาวะที่ไม่มีเหล็ก²⁰ ขณะที่การให้ holotransferrin ก่อนได้รับ dihydroartemisinin ไม่มีผลต่อเซลล์เต้านมปกติแต่เพิ่มฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งเต้านม²¹ และเพิ่มความไวต่อรังสี (radiosensitivity) ของเซลล์มะเร็ง¹⁵ นอกจากนั้นพบว่า transferrin เพิ่มฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งของ artemisinin ด้วยเห็นกัน²² และเมื่อสังเคราะห์อนุพันธ์ใหม่ขึ้นโดยนำเอา artemisinin มาเข้ามต่อด้วย holotransferrin (artemisinin-tagged holotransferrin) พบว่ามีฤทธิ์ในการผ่าเซลล์มะเร็งมากกว่า artemisinin เดิม²³

ตัวอย่างรายงานการศึกษาในสัตว์ทดลองที่แสดงถึงประสิทธิภาพของยาในกลุ่มอาร์ทีมิชินินในการรักษามะเร็งชนิดต่าง ๆ เช่น การใช้ artemisinin ปริมาณ 10 มก. ร่วมกับ $FeSO_4$ ปริมาณ 10 มก. ต่อวันเพื่อรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองในสุนัขอายุ 7 ปี พบว่าทำให้ต่อมน้ำเหลืองมีขนาดเล็กลงอย่างมีนัยสำคัญ แต่เมื่อหยุดการรักษาพบว่าต่อมน้ำเหลืองเหล่านั้นกลับมีขนาดโตขึ้นและทำให้สุนัขตายในอีก 5 เดือนต่อมา และเมื่อนำมาใช้ในการยับยั้งการสร้างเนื้องอกของมะเร็งชนิดอื่นหลังผ่าตัดในสุนัขอีก 2 ราย โดยช่วงแรกมีการให้ยา artemisinin ร่วมกับ $FeSO_4$ ในปริมาณเท่าเดิมติดต่อกันเป็นเวลากว่า 7-23 วันและตามด้วย artemisinin อย่างเดียวอีก 10 วัน พบว่าไม่เกิดการกลับเป็นใหม่อีกเมื่อติดตามอาการต่อมาในเวลากว่า 3-4 เดือน²⁴

การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารกลุ่มอาร์ทีมิชินินทางคลินิก

ปีค.ศ. 2005 Berger และคณะได้รายงานเป็นครั้งแรกในการใช้ artesunate ร่วมกับยาต้านมะเร็งมาตรฐานเพื่อรักษามะเร็ง metastatic uveal melanoma ระยะที่ 4 ในผู้ป่วย 2 รายที่ใช้ยาต้านมะเร็งมาตรฐานเพียงตัวเดียวแล้วไม่ได้ผล ซึ่งในผู้ป่วยรายแรกเมื่อได้รับยา artesunate ร่วมกับ fotemustine มีการตอบสนองต่อยาแต่ไม่สามารถหยุดการพัฒนาของโรคได้ ส่วนผู้ป่วยรายที่สองพบว่าการให้ยา artesunate ร่วมกับ dacarbazine ทำให้การดำเนินของโรคลดลงแม้ว่าสุดท้ายได้มีการกระจายตัวของมะเร็งไปที่ม้ามและปอด แต่พบว่าสามารถทำให้ผู้ป่วยมีอายุนานถึง 47 เดือน เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วไปที่ 2-5 เดือน²⁵ เนื่องจากเป็นช่วงแรกของการศึกษาวิจัยทางคลินิกของยาในกลุ่มนี้จึงมีการเลือกผู้ป่วยในระยะที่ 4 ซึ่งมีแนวโน้มของการรักษาหายต่ำมาเป็นอาสาสมัครในการศึกษา

เมแทบอลิซึมและเภสัชจลนศาสตร์

เมื่อยากลุ่มอาร์ทีมิซินดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย ยาส่วนใหญ่เปลี่ยนรูปโดยเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 (cytochrome P450) เป็น dihydroartemisinin²⁶ ซึ่งมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อมาลาเรียได้ดีกว่า artemisinin ถึง 100 เท่า²⁷ โดยมีค่าครึ่งชีวิตในการกำจัด ($t_{1/2}$ elimination) เพียง 45 นาที^{28, 29} และ dihydroartemisinin ในปริมาณมากกว่า 90% จับกับโปรตีนในกระแสโลหิต (plasma protein)³⁰ การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ยังกลุ่มนี้ทำได้จำกัด เพราะความยากในการวิเคราะห์ปริมาณซึ่งส่วนใหญ่ศึกษาโดยการทดสอบฤทธิ์การฆ่าเชื้อมาลาเรีย สำหรับ artesunate ในรูปแบบรับประทานมีชีวอนุเคราะห์ (bioavailability) ประมาณ 60% ในอาสาสมัครผู้ติดเชื้อมาลาเรีย³¹ โดยเวลาที่พบยาความเข้มข้นสูงสุดในรูป dihydroartemisinin ในช่วงเวลา 1-2 ชั่วโมง^{28, 32, 33} ส่วนยาเตรียมรูปแบบยา丸รับประทานของ artemisinin dihydroartemisinin และ artemether นั้นไม่มีค่าชีวอนุเคราะห์สัมบูรณ์ เพราะไม่มียาเตรียมรูปยา丸ดีเข้าหลอดเลือดดำ แต่สามารถกำจัดเชื้อมาลาเรียในคนไข้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับการดูดซึมและการกำจัดยาอย่างรวดเร็ว³⁴⁻³⁶

การให้ artemether ในรูปแบบยา丸ดีเข้าทางกล้ามเนื้อมีค่าชีวอนุเคราะห์สัมพัทธ์ต่ำเมื่อเทียบกับชนิดรับประทาน³⁴ โดยพบว่าประมาณ 10% ของการรักษาโรมาลาเรียชนิดรุนแรงด้วยรูปแบบยาเตรียมเข้ากล้ามเนื้อไม่สามารถกำจัดเชื้อในเลือดได้ ซึ่งสอดคล้องกับการตรวจไม่พบยาในเลือด³⁴ขณะที่ artesunate รูปแบบยา丸ดีกวันให้ค่าชีวอนุเคราะห์สัมบูรณ์มากกว่า 80% และพบยาที่ความเข้มข้นสูงสุดภายใน 1 ชั่วโมง^{29, 37} มีผลให้ artesunate ใช้รักษาโรมาลาเรียชนิดรุนแรงได้ดีกว่า artemether การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยา artemisinin และ dihydroartemisinin รูปแบบยา丸นับทวารหนักในผู้ป่วยเด็ก พบว่ายาดูดซึมได้เร็ว โดยพบยาที่ความเข้มข้นสูงสุดในช่วง 2 ชั่วโมงและมีค่าชีวอนุเคราะห์สัมพัทธ์ระหว่าง 20-80%^{29, 38, 39}

จากการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ในคนตั้งครรภ์ตั้งครรภ์ที่ 2 และ 3 พบร่วมกันตั้งครรภ์สามารถกำจัดยาได้รวดเร็วโดยมีระดับยาในเลือดต่ำกว่าในคนไม่ตั้งครรภ์ในการให้ยา artesunate ขนาด 4 มก./น้ำหนักตัว(กก.)/วัน ร่วมกับ atovaquone ขนาด 20 มก./น้ำหนักตัว(กก.)/วัน และ proguanil ขนาด 8 มก./น้ำหนักตัว(กก.)/วัน นาน 3 วัน จึงแนะนำให้มีการปรับขนาดยา artesunate ในคนตั้งครรภ์⁴⁰

ข้อมูลเภสัชจลนศาสตร์ทั้งหมดเหล่านี้มาจากการศึกษาวิจัยในอาสาสมัครสุขภาพดีหรือผู้ป่วยมาลาเรียเท่านั้น ซึ่งมีผลแตกต่างกันเล็กน้อย โดยอาจใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการบริหารยาเพื่อใช้ในการรักษาภาวะริง เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีรายงานการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ในผู้ป่วยมะเร็ง

อาการไม่พึงประสงค์

อาจพบอาการไม่พึงประสงค์บ้างที่เกี่ยวกับทางเดินอาหาร เช่น อาการคลื่นไส้อาเจียน และมีการแพ้อาย่างรุนแรง⁴¹ และการเกิดภาวะเลือดออก⁴²ได้ แต่พบน้อยมาก มีรายงานการเกิดพิษของยา artemether และ arteether ทางระบบประสาทพบได้ในสัตว์ทดลองและในเซลล์เพาะเลี้ยงซึ่งไม่พบในยาตัวอื่นในกลุ่มนี้^{7, 43, 44} โดยพบว่าหนูมีความผิดปกติของการเดินและการสูญเสียการตอบสนองแบบบริเพล็กซ์ ได้แก่ spinal reflexes, pain response reflexes, brain-stem และ eye reflexes เมื่อได้รับยาในขนาดสูงนาน 8 วัน⁷ อย่างไรก็ตามภายหลังการใช้มากกว่า 30 ปีกับประชากรจำนวนหลายล้านคนด้วยยาเตรียมหลายรูปแบบเพื่อการรักษามาลาเรีย ยังไม่พบการเกิดพิษดังกล่าวของยาในคนที่^{45, 46} สำหรับคนตั้งครรภ์ในช่วง 3 เดือนแรกควรพิจารณาการให้เป็นพิเศษแม้ว่าจะไม่มีรายงานการเกิดผลต่อการรักษาในครรภ์

ปฏิกิริยาต่อ กันระหว่างยา

ในการรักษามาลาเรียที่ผ่านมา มีการใช้ยาในกลุ่มอาร์ทีมิซินร่วมกับยาต้านมาลาเรียกลุ่มอื่น ๆ เช่น การใช้ artesunate กับ mefloquine หรือ การใช้ artemether กับ lumefantrine⁴⁷ เป็นต้น ยังไม่พบการเกิดอันตรกิริยาต่อ กัน

อย่างไรก็ตามพบว่าในกลุ่มอาการที่มีชิโนกระตุนการสร้างเอนไซม์ไซโตโครม P450 (ชนิด CYP2B6 และ CYP3A4) และโปรตีน MDR1 (multidrug resistance-1 protein) สูงขึ้นในเซลล์ตับและเซลล์กำไสเล็ก โดย artemisinin ทำหน้าที่เป็น ligand ของ nuclear receptor 2 ชนิด คือ pregnane X-receptor (PXR) และ constitutive androstane receptor (CAR) ใน การกระตุนการสร้าง CYP3A4 และ MDR1⁴⁸ โดย CYP3A4 เป็นเอนไซม์ที่ทำหน้าที่เมtababolize ยาส่วนใหญ่รวมทั้งยาในกลุ่มเดียวกัน เช่น doxorubicin, etoposide, paclitaxel และ tamoxifen เป็นต้น นอกจากนั้นพบว่า มีผลยับยั้งการสร้างเอนไซม์ไซโตโครม P450 ชนิด CYP1A2⁴⁹ ซึ่งสำคัญในการเปลี่ยนแปลงยาบางตัว เช่น TCAs (tricyclic antidepressants), caffeine, theophylline, warfarin เป็นต้น ดังนั้นจึงควรระวังการใช้ยาที่ร่วมกันยาที่ต้องถูกเปลี่ยนแปลงหรือกำจัดออกโดยโปรตีนทั้ง 4 ชนิดนี้ เพราะอาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อ กันระหว่างยาได้

บทสรุป

Artemisinin และอนุพันธ์สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้หลากหลายชนิด เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งตับ มะเร็งปอดทั้งชนิด small cells และ non-small cells มะเร็งเต้านม มะเร็งไต มะเร็งเซลล์ประสาท มะเร็งปากดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งผิวหนัง มะเร็งสมอง มะเร็งรังไข่ มะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งในช่องปาก เป็นต้น โดยพบว่าการให้เหล็กหรือ transferrin ก่อนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของยาแก่กลุ่มอาการที่มีชิโนกรามากขึ้น สำหรับฤทธิ์ในการต้านมะเร็งทางคลินิกพบว่าในการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง melanoma ชนิดแพร่กระจายในระยะสุดท้าย การใช้ยาอาการที่มีชิโนกรามากกับยาต้านมะเร็งมาตรฐานช่วยยืดระยะเวลาในการมีชีวิตนานกว่า 10 เท่า เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในการรักษาด้วยยามาตรฐานเพียงอย่างเดียว กลไกการออกฤทธิ์ต้านมะเร็งของยาแก่กลุ่มนี้ที่สำคัญคือการกระตุ้นการต้านมาลาเรียโดยผ่านการเกิด oxidative stress ทำให้คราบร้าเลี้ยงการใช้ยาแก่กลุ่มนี้ร่วมกับสารต้านออกซิแดนต์ซึ่งนิยมให้ในผู้ป่วยมะเร็งเพื่อระจากทำให้ฤทธิ์ต้านมะเร็งของยาอาการที่มีชิโนกรามากกับการเกิด oxidative stressลดลงได้ นอกจากนั้นยังมีรายงานกลไกอื่น ๆ อีกในการออกฤทธิ์ต้านมะเร็งของยาแก่กลุ่มอาการที่มีชิโนกรามาก เช่น การยับยั้งการเจริญเติบโต การสร้างหลอดเลือด การเหนี่ยวแน่นให้เกิด apoptosis และความเกี่ยวข้องกับ oncogenes ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งแตกต่างจากยาต้านมะเร็งอื่นที่มักออกฤทธิ์เฉพาะเพียงอย่างเดียว แม้ว่าผลข้างเคียงของยาจะต่ำแต่ควรระวังการเกิดอันตรายปฏิกิริยาระหว่างของยาแก่กลุ่มนี้โดยเฉพาะการใช้ร่วมกับยาต้านมะเร็งอื่น เนื่องจากการกระตุนการสร้าง CYP3A4/MDR1 และยับยั้ง CYP1A2

เอกสารอ้างอิง

1. Kopfstein, L, Christofori, G. Metastasis: cell-autonomous mechanisms versus contributions by the tumor microenvironment. *Cell Mol Life Sci* 2006;63:449-68.
2. สำนักงานสถิติแห่งชาติ. สถิติสุขภาพ: สาเหตุการตาย. ตารางที่ 2-3. http://service.nso.go.th/nso/data/data23/data23_4.html.Date.
3. Rafi, I. An introduction to use of anticancer drugs. Chapter 4: Complications of cancer therapy. China: Elsevier limited, 2006: 59-74.
4. Rafi, I. An introduction to use of anticancer drugs. Chapter 1: Introduction to anticancer drugs. Drug resistance. China: Elsevier limited, 2006: 2-3.
5. Woodrow, CJ, Haynes, RK, Krishna, S. Artemisinins. *Postgrad Med J* 2005;81:71-8.
6. Ribeiro, IR, Olliaro, P. Safety of artemisinin and its derivatives. A review of published and unpublished clinical trials. *Med Trop (Mars)* 1998;58:50-3.

7. Brewer, TG, Peggins, JO, Grate, SJ, et al. Neurotoxicity in animals due to arteether and artemether. *Trans R Soc Trop Med Hyg* 1994;88 Suppl 1:S33-6.
8. Sun, WC, Han, JX, Yang, WY, et al. [Antitumor activities of 4 derivatives of artemisic acid and artemisinin B in vitro]. *Zhongguo Yao Li Xue Bao* 1992;13:541-3.
9. Efferth, T. Molecular pharmacology and pharmacogenomics of artemisinin and its derivatives in cancer cells. *Curr Drug Targets* 2006;7:407-21.
10. Efferth, T, Dunstan, H, Sauerbrey, A, et al. The anti-malarial artesunate is also active against cancer. *Int J Oncol* 2001;18:767-73.
11. Efferth, T, Olbrich, A, Bauer, R. mRNA expression profiles for the response of human tumor cell lines to the antimalarial drugs artesunate, arteether, and artemether. *Biochemical Pharmacology* 2002;64:617-23.
12. Rinner, B, Siegl, V, Purstner, P, et al. Activity of novel plant extracts against medullary thyroid carcinoma cells. *Anticancer Res* 2004;24:495-500.
13. Dell'Eva, R, Pfeffer, U, Vene, R, et al. Inhibition of angiogenesis in vivo and growth of Kaposi's sarcoma xenograft tumors by the anti-malarial artesunate. *Biochemical Pharmacology* 2004;68:2359-66.
14. Oda, D, Habte, T, Yamachika, E. Artemisinin: an alternative treatment for oral cancer. *Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology* 2004;98:204.
15. Kim, SJ, Kim, MS, Lee, JW, et al. Dihydroartemisinin enhances radiosensitivity of human glioma cells in vitro. *J Cancer Res Clin Oncol* 2006;132:129-35.
16. Lee, J, Zhou, HJ, Wu, XH. Dihydroartemisinin downregulates vascular endothelial growth factor expression and induces apoptosis in chronic myeloid leukemia K562 cells. *Cancer Chemother Pharmacol* 2006;57:213-20.
17. Disbrow, GL, Baege, AC, Kierpiec, KA, et al. Dihydroartemisinin is cytotoxic to papillomavirus-expressing epithelial cells in vitro and in vivo. *Cancer Res* 2005;65:10854-61.
18. Woerdenbag, HJ, Moskal, TA, Pras, N, et al. Cytotoxicity of artemisinin-related endoperoxides to Ehrlich ascites tumor cells. *J Nat Prod* 1993;56:849-56.
19. Shterman, N, Kupfer, B, Moroz, C. Comparison of transferrin receptors, iron content and isoferitin profile in normal and malignant human breast cell lines. *Pathobiology* 1991;59:19-25.
20. Efferth, T, Benakis, A, Romero, MR, et al. Enhancement of cytotoxicity of artemisinins toward cancer cells by ferrous iron. *Free Radical Biology and Medicine* 2004;37:998-1009.
21. Singh, NP, Lai, H. Selective toxicity of dihydroartemisinin and holotransferrin toward human breast cancer cells. *Life Sciences* 2001;70:49-56.
22. Sadava, D, Phillips, T, Lin, C, et al. Transferrin overcomes drug resistance to artemisinin in human small-cell lung carcinoma cells. *Cancer Letters* 2002;179:151-6.
23. Lai, H, Sasaki, T, Singh, NP, et al. Effects of artemisinin-tagged holotransferrin on cancer cells. *Life Sciences* 2005;76:1267-79.
24. Lai, H, C. Singh, Narendra, P. Methods of inhibition or killing cancer cells using an endoperoxide. USA: University of Washington (Seattle, WA), 1996.

25. Berger, TG, Dieckmann, D, Efferth, T, et al. Artesunate in the treatment of metastatic uveal melanoma—first experiences. *Oncol Rep* 2005;14:1599-603.
26. Haynes, RK. Artemisinin and derivatives: the future for malaria treatment? *Curr Opin Infect Dis* 2001;14:719-26.
27. Li, ZL, Gu, HM, Warhurst, DC, et al. Effects of qinghaosu and related compounds on incorporation of [G-3H] hypoxanthine by Plasmodium falciparum in vitro. *Trans R Soc Trop Med Hyg* 1983;77:522-3.
28. Batty, KT, Le, AT, Ilett, KF, et al. A pharmacokinetic and pharmacodynamic study of artesunate for vivax malaria. *Am J Trop Med Hyg* 1998;59:823-7.
29. Ilett, KF, Batty, KT, Powell, SM, et al. The pharmacokinetic properties of intramuscular artesunate and rectal dihydroartemisinin in uncomplicated falciparum malaria. *Br J Clin Pharmacol* 2002;53:23-30.
30. Batty, KT, Ilett, KF, Davis, TM. Protein binding and alpha : beta anomer ratio of dihydroartemisinin in vivo. *Br J Clin Pharmacol* 2004;57:529-33.
31. Teja-Isavadharm, P, Watt, G, Eamsila, C, et al. Comparative pharmacokinetics and effect kinetics of orally administered artesunate in healthy volunteers and patients with uncomplicated falciparum malaria. *Am J Trop Med Hyg* 2001;65:717-21.
32. Benakis, A, Paris, M, Loutan, L, et al. Pharmacokinetics of artemisinin and artesunate after oral administration in healthy volunteers. *Am J Trop Med Hyg* 1997;56:17-23.
33. Bethell, DB, Teja-Isavadharm, P, Cao, XT, et al. Pharmacokinetics of oral artesunate in children with moderately severe Plasmodium falciparum malaria. *Trans R Soc Trop Med Hyg* 1997;91:195-8.
34. Silamut, K, Newton, PN, Teja-Isavadharm, P, et al. Artemether bioavailability after oral or intramuscular administration in uncomplicated falciparum malaria. *Antimicrob Agents Chemother* 2003;47:3795-8.
35. De Vries, PJ, Tran, KD, Nguyen, XK, et al. The pharmacokinetics of a single dose of artemisinin in patients with uncomplicated falciparum malaria. *Am J Trop Med Hyg* 1997;56:503-7.
36. Newton, PN, van Vugt, M, Teja-Isavadharm, P, et al. Comparison of oral artesunate and dihydroartemisinin antimalarial bioavailabilities in acute falciparum malaria. *Antimicrob Agents Chemother* 2002;46:1125-7.
37. Nealon, C, Dzeing, A, Muller-Romer, U, et al. Intramuscular bioavailability and clinical efficacy of artesunate in gabonese children with severe malaria. *Antimicrob Agents Chemother* 2002;46:3933-9.
38. Halpaap, B, Ndjave, M, Paris, M, et al. Plasma levels of artesunate and dihydroartemisinin in children with Plasmodium falciparum malaria in Gabon after administration of 50-milligram artesunate suppositories. *Am J Trop Med Hyg* 1998;58:365-8.
39. Koopmans, R, Ha, LD, Duc, DD, et al. The pharmacokinetics of artemisinin after administration of two different suppositories to healthy Vietnamese subjects. *Am J Trop Med Hyg* 1999;60:244-7.
40. McGready, R, Stepniewska, K, Ward, SA, et al. Pharmacokinetics of dihydroartemisinin following oral artesunate treatment of pregnant women with acute uncomplicated falciparum malaria. *Eur J Clin Pharmacol* 2006;62:367-71.
41. Leonardi, E, Gilvary, G, White, NJ, et al. Severe allergic reactions to oral artesunate: a report of two cases. *Trans R Soc Trop Med Hyg* 2001;95:182-3.

42. Orjih, AU. Haemolysis of Plasmodium falciparum trophozoite-infected erythrocytes after artemisinin exposure. *Br J Haematol* 1996;92:324-8.
43. Kamchonwongpaisan, S, McKeever, P, Hossler, P, et al. Artemisinin neurotoxicity: neuropathology in rats and mechanistic studies in vitro. *Am J Trop Med Hyg* 1997;56:7-12.
44. McLean, WG, Ward, SA. In vitro neurotoxicity of artemisinin derivatives. *Med Trop (Mars)* 1998;58:28-31.
45. Van Vugt, M, Angus, BJ, Price, RN, et al. A case-control auditory evaluation of patients treated with artemisinin derivatives for multidrug-resistant Plasmodium falciparum malaria. *Am J Trop Med Hyg* 2000;62:65-9.
46. Kissinger, E, Hien, TT, Hung, NT, et al. Clinical and neurophysiological study of the effects of multiple doses of artemisinin on brain-stem function in Vietnamese patients. *Am J Trop Med Hyg* 2000;63:48-55.
47. Giao, PT, de Vries, PJ. Pharmacokinetic interactions of antimalarial agents. *Clin Pharmacokinet* 2001;40:343-73.
48. Burk, O, Arnold, KA, Nussler, AK, et al. Antimalarial artemisinin drugs induce cytochrome P450 and MDR1 expression by activation of xenosensors pregnane X receptor and constitutive androstane receptor. *Mol Pharmacol* 2005;67:1954-65.
49. Bapiro, TE, Sayi, J, Hasler, JA, et al. Artemisinin and thiabendazole are potent inhibitors of cytochrome P450 1A2 (CYP1A2) activity in humans. *Eur J Clin Pharmacol* 2005;61:755-61.

คำถาม

1. ข้อใดไม่ใช้ข้อจำกัดของการใช้เคมีบำบัดในการรักษามะเร็งในปัจจุบัน

1. การดื้อยา
2. ราคายา
3. ผลข้างเคียง
4. ออกฤทธิ์เฉพาะที่
5. ความจำเพาะเจาะจง

2. โครงสร้างทางเคมีของยาที่มีชื่นนิจัดอยู่กลุ่มใด

1. Steroids
2. Flavonoids
3. Anthracyclines
4. Cyclic depsipeptides
5. Sesquiterpene lactones

3. ปัญหาใดที่พบได้บ่อยในการรักษามาลาเรียด้วยยาจากกลุ่มยาที่มีชื่นนิจ

1. Drug resistance
2. Recrudescence
3. Neurotoxicity
4. Side effects
5. Allergy

4. เมื่อยาจากกลุ่มยาที่มีชื่นนิจเข้าสู่ร่างกายได้ถูกเปลี่ยนเป็นสารออกฤทธิ์ (active compound) ได้ในการต้านมาลาเรีย

1. Dihydroartemisinin
2. Deoxyartemisinin
3. Artelinate
4. Arteether
5. Artesunate

5. ส่วนใดของยาที่มีชื่นนิจที่จำเป็นในการออกฤทธิ์ต้านการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง

1. acetyl amide
2. Endoperoxide
3. Benzoate
4. Terpene
5. phenone

6. สารกลุ่มยาที่มีชื่นนิจสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้

1. Leukemia
2. Breast cancer
3. Lung cancer
4. Colon cancer
5. ถูกทุกข้อ

7. สารได้ช่วยเสริมฤทธิ์ต้านมะเร็งของยาอาร์ทีมิซินิน

1. Ascorbic acid
2. Retinoic acid
3. Ferrous sulfate
4. Selenium
5. topopherol

8. ข้อได้ถูกต้องเกี่ยวกับตัวอย่างการศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งของยากระเพาะกลุ่มอาร์ทีมิซินินทางคลินิกในผู้ป่วยมะเร็ง metastatic uveal melanoma ระยะที่ 4

1. การให้ยาอาร์ทีมิซินินเดี่ยวสามารถรักษาให้หายได้
2. การให้ยาอาร์ทีมิซินินเดี่ยวช่วยให้มีชีวิตดอนานขึ้น
3. การให้ร่วมกับยาต้านมะเร็งอื่นไม่ให้ผลแตกต่าง
4. การให้ร่วมกับยาต้านมะเร็งอื่นสามารถรักษาให้หายได้
5. การให้ร่วมกับยาต้านมะเร็งอื่นช่วยให้มีชีวิตดอนานขึ้น

9. สารตัวได้ในกลุ่มอาร์ทีมิซินินที่พบความเป็นพิษต่อระบบประสาท

1. Dihydroartemisinin
2. Deoxyartemisinin
3. Artelinate
4. Arteether
5. Artesunate

10. สารใดต่อไปนี้ที่อาจเกิดปฏิกิริยาต่อกันกับยากระเพาะกลุ่มอาร์ทีมิซินินได้

1. Acetaminophen
2. Indinavir
3. Tamoxifen
4. Mefloquine
5. Chlorpheniramine